

Influenssa A(H1N1)v -infektion kotihoito-ohjeet ja hoitoon hakeutuminen

Influenssa A (H1N1)v –virus aiheuttaa samanlaisia oireita kuin muutkin influenssavirukset. Yleisimpiä oireita ovat äkillinen kuume, kurkkukipu, yskä ja nuha. Influenssa ei tyypillisesti ala pelkällä nuhalla. Muita mahdollisia oireita ovat jäsenten särky, päänsärky, vilunväristykset ja väsymys. Oksentelu ja ripuli eivät ole tavallisia influenssassa, mutta näitäkin oireita voi esiintyä. Lapsilla voi esiintyä vatsakipua.

INFLUENSSAN TARTTUMINEN

Influenssavirus tarttuu henkilöstä toiseen yskittäessä ja aivastettaessa tai hengitystie-eritteillä tahrautuneiden esineiden tai käsien välityksellä.

TARTUNTAVARAAN VOI VÄHENTÄÄ SEURAAVILLA TOIMILLA

- Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla kun yskit tai aivastat. Heitä käytetty nenäliina roskeen.
- Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.
- Pese kädet vedellä ja saippualla tai käytä alkoholipitoisia käsien desinfiointiaineita, erityisesti yskittyäsi tai aivastettuasi.
- Vältä koskemasta silmiä, nenää tai suuta, ellet ole juuri pessyt käsiäsi.

INFLUENSSAN HOITO KOTONA

1. Kun sairastut

- Jos oireesi ovat lieviä etkä kuulu riskiryhmiin (kts. alempana), lääkärin tekemää taudinmääritystä tai viruslääkehoitoa ei pääsääntöisesti tarvita.
- Älä mene sairaana töihin.
- Työntekijä voi palata töihin, kun kuume on poissa ja muut oireet ovat vähenemässä.
- Älä hoida pieniä lapsia sairaana ollessasi.
- Lepo ja riittävä nesteiden nauttiminen on tärkeää.
- Kuumetta ja särkyä voi lievittää apteekista ilman reseptiä saatavilla lääkkeillä.
- Tarkkaile vointiasi ja ota tarvittaessa puhelimitse yhteyttä terveyskeskukseen.

2. Kun hoidat sairastunutta kotona

- Vältä lähikosketusta sairastuneen kanssa, tämä on erityisen tärkeää riskiryhmiin (kts. alempana) kuuluville.
- Huolehdi hyvästä käsihygieniasta (erityisesti lapsia kannattaa muistuttaa pesemään kätensä riittävän usein).
- Kun kotona on influenssaan sairastunut henkilö, samassa taloudessa asuvat voivat pienentää tartuntariskiä:
 - ❖ Vain yksi aikuinen hoitaa sairastunutta, jos mahdollista.
 - ❖ Riskiryhmään kuuluvan henkilön ei tulisi olla sairastuneen ensisijainen hoitaja.
 - ❖ Sairastuneen tulisi pysytellä eri huoneessa kuin muut samassa taloudessa olevat henkilöt.
 - ❖ Jos kuulut riskiryhmään (etkä voi välttää lähikosketusta sairastuneeseen), harkitse suun-
nenäsuojaimen käyttämistä.
 - ❖ Älä kutsu vierailijoita kotiin sairastamisen aikana.
 - ❖ Kuivaa kädet paperipyyhkeillä, vaihtoehtoisesti jokaiselle oma, erivärinen pyyhe.
 - ❖ Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta yhteisissä tiloissa (esim. avaamalla ikkunat WC-tiloissa, keitti-
össä ja kylpyhuoneessa).
- Tarkkaile sairastuneen vointia ja ota tarvittaessa puhelimitse yhteys terveyskeskukseen.

3. Sairaalan lapsen hoitaminen

- Lapsen tulee olla poissa päivähoitosta tai koulusta siihen asti, että kuume on pois ja muut oireet vähenemässä.
- Influenssaa sairastavan lapsen hoitoon pätevät samat ohjeet kuin edellä.
- Vain yksi aikuinen hoitaa sairastunutta, jos mahdollista.
- Riskiryhmään kuuluvan henkilön ei tulisi olla sairastuneen ensisijainen hoitaja.
- Huolehdi, että lapsi saa riittävästi nestettä. Jos ruoka ei maistu esim. kurkkukivun vuoksi, energiaa saa sokeripitoisesta juomasta.
- Tarkkaile lapsen vointia ja ota tarvittaessa puhelimitse yhteys terveyskeskukseen.

4. Siivoaminen, pyykinpesu ja puhtaanapito

- Muista pestä kätesi, jos kosket käytettyihin nenäliinoin yms.
- Pyyhi kosketus- ja pöytäpinnot päivittäin tavanomaisella puhdistusaineella.
- Sairastuneiden henkilöiden käyttämiä liinavaatteita, aterimia ja astioita ei tarvitse pestä erikseen, mutta ne tulisi pestä tai puhdistaa huolellisesti ennen kuin muut koskevat niihin.
- Pese liinavaatteet tavanomaiseen tapaan.

1. Välitöntä hoitoa vaativat oireet influenssaa sairastavilla lapsilla

- Jos lapsi sairastuu ja hänellä ilmenee jokin seuraavista oireista, hakeudu mahdollisimman pian lääkärin hoitoon:
 - ❖ Hengitysvaikeuksia
 - ❖ Iho on sinertävä tai harmaa
 - ❖ Lapsi ei juo tarpeeksi
 - ❖ Lapsi oksentaa voimakkaasti tai jatkuvasti
 - ❖ Lapsi ei herää tai reagoi mihinkään
 - ❖ Lapsi on niin ärtyisä, ettei hän halua olla sylissä
 - ❖ Influenssan kaltaiset oireet häviävät, mutta palaavat sitten kuumeen ja pahemman yskän kera

2. Välitöntä hoitoa vaativat oireet influenssaa sairastavilla aikuisilla

- Jos sairastut ja sinulla ilmenee jokin seuraavista oireista, hakeudu mahdollisimman pian lääkärin hoitoon:
 - ❖ Hengitysvaikeuksia
 - ❖ Kipu tai paine rinnassa
 - ❖ Äkillinen huimaus tai sekavuus
 - ❖ Voimakas tai jatkuva oksentelu
 - ❖ Influenssan kaltaiset oireet häviävät, mutta palaavat sitten kuumeen ja pahemman yskän kera

3. Riskiryhmään kuuluvat ottavat yhteyttä terveyskeskukseen tai lääkäriin herkemmin

- Jos sinulle/lapsellesi nousee äkillinen kuume (38 °C tai yli, alle 3-vuotiaalla yli 38,5 °C) ja tautiin liittyy kurkkukipua, yskää tai nuhaa ja kuulut johonkin alla olevista riskiryhmistä, ota herkemmin yhteys lääkäriin:
 - ❖ Olet raskaana
 - ❖ Säännöllistä lääkitystä vaativa sydänsairaus (ei lievä verenpainetauti) tai keuhkosairaus (säännöllistä lääkitystä saava astmapotilas) tai diabetes
 - ❖ Krooninen maksan tai munuaisen vajaatoiminta
 - ❖ Vastustuskykyä heikentävä tauti, esim. leukemia, lymfooma, HIV-infektio
 - ❖ Tauti, johon saat vastustuskykyä heikentävää hoitoa (elinsiirto, solunsalpaajat, TNF-alfasalpaaja, kortikosteroidi >15 mg/vrk yli 2 viikon kestoisena, muu vastustuskykyä heikentävä hoito)
 - ❖ Krooninen neurologinen sairaus tai hermolihastauti
 - ❖ Sairaalloinen ylipaino (BMI eli Body Mass Index yli 40)

Karviaisen influenssaneuvonta palvelee ma-to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.00 numeroissa

- 044 – 767 4838
- 044 – 767 4839
- 044 – 767 4840

Valtakunnallisen sikainfluenssaneuvontapuhelin palvelee ma-pe klo 9.00-18.00 numeroissa

- 0800 02277 suomeksi
- 0800 02278 ruotsiksi